



AZIENDA USL 4 PRATO



2° Workshop Nazionale “Osservatori per gli incidenti stradali: dai dati alle azioni” Strumenti per le politiche di sicurezza

Scandinavi sulle strade Mediterranei a tavola

Cipriani F.¹, Berti A.², Orsini C.², Voller F.², Pasquini J.², Silvestri C.²

¹ UF di Epidemiologia – ASL 4 – Prato


² Area Epidemiologia Sociale – Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

Consumo di vino in Italia: 1961-2003



Fonte: World Drink Trends 2005


Consumo di birra in Italia: 1961-2003



Fonte: World Drink Trends 2005

Consumo di superalcolici in Italia: 1961-2003

Consumo di superalcolici in Italia:
1961 - 2003




Fonte: World Drink Trends 2005

Consumo di alcol totale in Italia: 1961-2003



Fonte: World Drink Trends 2005


Bevitori di 5 bicchieri e più per giorno della settimana



Fonte: indagine EDIT - ARS

I FATTORI DI RISCHIO: ALCOL

Percentuale di coloro che hanno guidato dopo aver bevuto troppo nell'ultimo anno (soli guidatori)




MASCHI
FEMMINE
TOTALE

31,9%
12,9%
22,5%

Fonte: indagine EDIT - ARS

I FATTORI DI RISCHIO: SOSTANZE

Percentuale di coloro che hanno guidato dopo aver assunto almeno una sostanza nell'ultimo anno (%)



Fonte: indagine EDIT - ARS

I FATTORI DI RISCHIO


	INCIDENTI (OR; IC95%) agg. per età		
	Senza conseguenze	Con accesso PS	Con ricovero
Bevitore a rischio	1,2 (0,9-1,7)	1,3 (0,9-2,0)	2,4 (1,3-4,6)
Ripetente	1,1 (0,9-1,4)	1,4 (1,1-1,9)	2,5 (1,8-3,6)
Fumatore regolare	1,7 (1,3-2,1)	2,2 (1,7-2,9)	2,6 (1,8-3,7)
Uso di sostanze ultimo mese	1,3 (1,0-1,7)	1,5 (1,2-2,0)	1,5 (1,0-2,2)
Maschi	2,0 (1,7-2,4)	1,5 (1,2-1,8)	3,5 (2,4-4,9)

Alcol – Pattern e conseguenze


	RICREAZIONALE	NUTRIZIONALE
Età	Giovani	Adulti
Sesso	Maschi	Maschi
Ambito	Ricreativo	Nutrizionale
Dove	Fuori casa	In casa
Con chi	Amici	Famiglia
Tipo bevanda preferita	Birra	Vino
Motivazione	Psicologica	Gusto
Prototipo conseguenze	Incidenti	Cirrosi - Tumori

Alcol e mortalità

Rappresentazione grafica del rischio relativo di morte per consumo di alcol: "U- SHAPED"



Nuova piramide della nutrizione – Da: W. Willett, 2005



NEW FOOD PYRAMID

outlined by the authors distinguishes between healthy and unhealthy types of fat and carbohydrates. Fruits and vegetables are still recommended, but the consumption of dairy products should be limited.

**Verso una Politica Integrata Toscana:
Agricoltura – Sanità – Turismo – Economia -
Sicurezza**

**Scandinavi sulle strade
Mediterranei a tavola**